

レジメン名		略名	1クールの日数	
アービタックス・イリノテカン療法		Cet+CPT-11	7W	
適応病名	大腸癌	所要時間	初回315分 2回目以降 90分または195分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	N Engl J Med 351:337-45,2004			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	アービタックス	1回目400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	d.i.v	d1,8,15,22,29,36,43
2	イリノテカン	150mg/m ²	d.i.v	d1,15,29
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)	イリノテカンは前治療と同量			

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 アービタックス・イリノテカン療法					
Rp	医薬品名	投与量		投与ルート	点滴時間・速度
		D1	D8		
①	デキサト注 生理食塩水 ポラミン注	初回13.2mg 2回目以降6.6mg 100mL 1A	6.6mg 100mL 1A	P	30分
②	アービタックス 生理食塩水	①400mg/m ² ②~250mg/m ² 250mL	①400mg/m ² ②~250mg/m ² 250mL	P	初回 2時間 2回目 ~1時間
③	生理食塩水	100mL		P	初回 1時間 2回目 ~30分
④	アロキシ静注用 ブスコパン注	0.75mg 1A		P	15分
⑤	イリノテカン 生理食塩水	150mg/m ² 250mL		P	90分
⑥	生理食塩水	20mL	20mL	V	流し