

レジメン名		略名	1クールの日数	
アービタックス・FOLFOX6療法		Cet+ FOLFOX6	14日	
適応病名	大腸癌	所要時間	初回355分 2回目以降 90分または225分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他( )	放射線療法	■なし、□あり	
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他( )			
ガイドライン 文献名	Bokemeyer C, et al. J Clin Oncol 2009;27:663-671			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1, d8等)
1	アービタックス	1回目400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	CV	D1,8
2	エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	側管	D1
3	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	CV	D1
4	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	CV	D1
5	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	CV	D1-2
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)				

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 アービタックス・FOLFOX6療法

Rp	医薬品名	投与量		投与ルート	点滴時間・速度
		D1	D8		
①	デキサート注 生理食塩水 ボララミン注	初回13.2mg 2回目以降6.6mg 100mL 1A	6.6mg 100mL 1A	CV	30分
②	アービタックス 生理食塩水	①400mg/m <sup>2</sup> ②~250mg/m <sup>2</sup> 250mL	①400mg/m <sup>2</sup> ②~250mg/m <sup>2</sup> 250mL	CV	初回 2時間 2回目 ~1時間
③	生理食塩水	100mL		CV	初回 1時間 2回目 ~30分
④	アロキシ注	0.75mg		CV	15分
⑤	レボホリナート注 5%大塚糖液	200mg/m <sup>2</sup> 250mL		CV	120分
⑥	エルプラット 5%大塚糖液	85mg/m <sup>2</sup> 250mL		CV	⑤の側管 120分
⑦	5-FU 生理食塩水	400mg/m <sup>2</sup> 50ml		CV	10分
⑧	5-FU 生理食塩水	2400mg/m <sup>2</sup> 適量		CV	リアフューザーを使用 して2日間で