

レジメン名		略名	1クールの日数	
メソトレキセート・5-FU療法		MTX+5FU	1W-2W	
適応病名	胃癌	所要時間	240分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	癌と化学療法 16:2545-55,1989 Jpn J Clin Oncol 2004 Jun;34(6):316-22			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	メソトレキセート	100mg/m ²	d.i.v	d1
2	5-FU	600mg/m ²	d.i.v	d1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)	ロイコボリン10~15mg内服または点滴。MTX投与後24時間後から開始6時間ごと計6回投与			

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名	MTX+5FU療法	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
(下に前投薬からの投与方法を記載)				
Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	ダイアモックス注500mg 生理食塩水	1/2V 50mL	P	10分
②	グラニセロン注 デキサート注	100mL 6.6mg	P	30分
③	メソトレキセート 生理食塩水	100mg/m ² 50mL	P	10分
④	ソルデム3A メイロン注	500mL 40mL	P	3時間(2回目以降は2時間)
⑤	5-FU 生理食塩水	600mg/m ² 50mL	P	10分(MTX投与1~3時間後)
⑥	生理食塩水	20mL	V	流し