

レジメン名		略名	1クールの日数	
nab-PTX+GEM			28日	
適応病名	膵癌	所要時間	90分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	□なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	NEJM 369(18) 1691-1703, 2013			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	アブラキサン	125mg/m ²	div	d1,d8,d15
2	ゲムシタビン	1000mg/m ²	div	d1,d8,d15
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
その他 (減量・ 増量規定 など)	アルブミン結合薬剤のため同意書必要			

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 nabPTX+GEM療法 (下に実際の投与方法を記載)		
	投与量	点滴時間
P ①	グラニセロン注 デキサート注	100mL 6.6mg 30分
P ②	アブラキサン注 生食 (1Vあたり20mLで溶解)	125mg/m ² 適量 30分
P ③	生食	50mL フラッシュ用
P ④	ゲムシタビン注 生理食塩水	1000mg/m ² 100mL 30分
V ⑤	生理食塩水	20ml