

レジメン名			略名	1クールの日数		
ペムプロリズマブ200mg(3w)+nabパクリタキセル			KEY+nab-PTX	28日		
適応病名	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌	所要時間	75	分		
実施部署	外来	放射線療法	なし			
適応分類	進行・再発					
適応時表示 コメント	あり	添付資料	あり			
臨床使用 分類	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5)					
	<input type="checkbox"/> 研究(<input type="checkbox"/> 多施設自主研究、 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究、 <input type="checkbox"/> 市販後臨床試験、 <input type="checkbox"/> 治験、 <input type="checkbox"/> その他)					
エビデンス	文献					
ガイドライン/ 文献名	Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial					
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)		
1	キイトルーダ・KEY	200mg	点滴	d1(3w毎)		
2	アブラキサン・nab-PTX	100mg/m2	点滴	d1,d8,d15		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
その他 (減量・ 增量規定 など)						

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 ペムプロリズマブ200mg(3w)+nabパクリタキセル (下に前投薬からの投与方法を記載)				
Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩水	100mL	DIV	ルートキープ用
②	キイトルーダ 生理食塩水	200mg 100mL	DIV	30分
③	生理食塩水	50mL	IV	フラッシュ用
④	生理食塩水 デキサート	50mL 6.6mg	DIV	15分
⑤	アブラキサン 生理食塩水 ※フィルター禁止	100mg/m2 50mL	DIV	30分
⑥	生理食塩水	20mL	DIV	フラッシュ用