

レジメン名		略名	1クールの日数	
パドセブ療法			28日	
適応病名	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌		所要時間	30分
実施部署	■外来、■病棟、□その他()		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし ■あり	
臨床使用分類	■治療 (エビデンスレベル □1 ■2 □3 □4 □5) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他)			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他			
ガイドライン文献名	T. Powles, J. E. Rosenberg, G. P. Sonpavde, Y. Loriot, I. Durán, J. L. Lee, et al. N Engl J Med 2021 Vol. 384 Issue 12 Pages 1125-1135			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	エンホルツマブ パドチン(パドセブ)	1.25mg/kg(最大125mg)	div	d1,d8,d15
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他(減量・増量規定など)				

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 パドセブ療法
(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp 医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
① 生理食塩水	100 ml	div	ルートキープ
② パドセブ 注射用水 生理食塩水	1.25mg/kg 3.3mL/V 100 ml	div	30 min
③ 生理食塩水	20 ml	div	フラッシュ用

週1回投与3週連続、4週目休薬