

患者向け説明書：ダニ媒介脳炎ワクチン(タイコバック)この説明書は、タイコバック接種を受ける方に必要な情報をまとめたものです。接種前に必ずご確認ください。

ダニ媒介脳炎(TBE)とは

- **原因:**ダニ媒介脳炎ウイルスによる感染症。
- **感染経路:**ウイルスを保有するマダニに刺されることで感染します。
- **症状:**発熱、頭痛、筋肉痛などに続き、一部で髄膜炎・脳炎を発症します。70%は無症状です。
- **重症度:**重症化すると神経学的後遺症が残ることがあります。

ワクチンの特徴

- **種類:**不活化ワクチン(商品名:タイコバック)。
- **接種方法:**筋肉注射または皮下注射。
- **効果:**3回接種で高い予防効果が期待されます。

接種スケジュール

- **通常:**1回目、1～3か月後に2回目、5～12か月後に3回目。
- **追加接種:**3年後に1回、その後は年齢・リスクに応じ3～5年ごと。

副反応について

- **よくある副反応:**注射部位の痛み、発赤、腫れ、頭痛、発熱、倦怠感。
- **まれな副反応:**強いアレルギー反応(アナフィラキシー)。

接種が推奨される方

- 流行地域へ渡航・長期滞在する方。日本では北海道、中国北部、中央アジア、ロシア、ヨーロッパ全域など30か国に分布。
- 森林・山岳地域で活動する方。

接種前の注意

- 現在の健康状態を医師に伝えてください。発熱や体調不良がある場合は接種を延期することがあります。
- 妊娠中・授乳中の方は医師へご相談ください。

接種後の注意

- 接種当日は激しい運動や飲酒を控えてください。
- 注射部位を清潔に保ち、異常があればすぐに医師へ相談してください。
- 強い症状が続く場合は速やかに医師へ相談してください。

まとめ

ダニ媒介脳炎は重篤な神経感染症です。流行地域へ渡航する方や感染リスクの高い方はワクチン接種をご検討ください。

この説明書は一般的な情報です。**詳細は必ず医師・医療機関にご相談ください。**

副反応確認のため、接種後20分間体調確認をさせていただきます。

帰宅後、体調の変化などがございましたら下記にお問い合わせ下さい。

秋田赤十字病院 電話 018-829-5000(代表)

平日(8:30-16:30)は予防接種センターでの対応、それ以外の時間帯は救急外来での対応となります。