レジメン名			略名	1クールの日数
CapeOX+ビロイ			CapeOX+ビロイ	21d
適応病名	CLDN18.2陽性胃癌		所要時間	120分
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル　□1　■2　□3　□4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他			
ガイドライン文献名	Shah MA, et al.Nat. Med. 2023; 29(8):2133-2141			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	カペシタビン	2000mg/m2 2x1	p.o.	d1-14
2	Oxaliplatin	130mg/m2	d.i.v.	d1
3	ビロイ	800/600mg/m2	d.i.v.	d1
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	初回は病棟、2回目以降外来

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	パロノセトロン	0.75mg	div	15分
	デキサート	13.2mg		
	ポララミン	5mg		
	ファモチジン	20mg		
②	ビロイ	初回800mg/m2 2回目以降600mg/m2	div	初回　100～400mg/m2/h 2回目以降　75～300mg/m2/h
	注射用水	100mg1Vあたり5mL		
	生食	2mg/mLになるように調製		
③	生食	50mL	div	フラッシュ用
④	オキサリプラチン	130mg/m2	div	120分
	5%ブドウ糖液	250mL		
⑤	生食	20mL	iv	フラッシュ用