レジメン名			略名	1クールの日数
食道癌　FOLFOX+NIVO			FOLFOX +Nivo	14d
適応病名	食道癌・食道胃接合部癌		所要時間	180分
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル　□1　■2　□3　□4　■5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、■その他			
ガイドライン文献名	接合部癌:Janjigian et al. Nivolumab plus chemotherapy versus chemotherapy as first-line treatment for advanced gastric cancer/gastroesophageal junction cancer/oesophageal adenocarcinoma (CheckMate 649): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 2021, 398, 27-40. 食道癌:DI フォーム			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ニボルマブ	240mg	d.i.v.	d1
2	オキサリプラチン	85mg/m2	d.i.v.	d1
3	l-LV	200mg/m2	d.i.v.	d1
4	5-FU	400mg/m2	i.v.	d1
5	5-FU	2400mg/m2	c.i.v.	d1-2
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生食	100mL	div	ルートキープ用
②	オプジーボ 生食	240mg 100mL	div	30分
③	生食	50mL	div	15分
④	パロノセトロン デキサート	0.75mg 6.6mg	div	15分
⑤	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m2 250mL	div	120分
⑥	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m2 250mL	div	⑤の側管から 120分
⑦	フルオロウラシル 生食	400mg/m2 50mL	div	10分
⑧	フルオロウラシル 生食	2400mg/m2 30mL	civ	インフューサー を使用して2日 間