レジメン名			略名	1クールの日数
FOLFOX+ビロイ			FOLFOX +ビロイ	14d
適応病名	CLDN18.2陽性胃癌		所要時間	48h
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル　□1　■2　□3　□4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他			
ガイドライン文献名	Shitara K, et al.: Lancet. 2023; 401(10389): 1655-1668			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ビロイ	800/400mg/m2	d.i.v.	d1
2	オキサリプラチン	85mg/m2	d.i.v.	d1
3	l-LV	200mg/m2	d.i.v.	d1
4	5-FU	400mg/m2	d.i.v.	d1
5	5-FU	2400mg/m2	c.i.v.	d1-2
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	初回は病棟、2回目以降外来

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	パロノセトロン デキサート ポララミン ファモチジン	0.75mg 13.2mg 5mg 20mg	div	15分
②	ビロイ 注射用水 生食	初回800mg/m2 2回目以降400mg/m2 100mg1Vあたり5mL 2mg/mLになるように調製	div	初回　100～400mg/m2/h 2回目以降　50～200mg/m2/h
③	生食	50mL	div	フラッシュ用
④	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m2 250mL	div	120分
⑤	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m2 250mL	div	⑤の側管から120分
⑥	フルオロウラシル 生食	400mg/m2 50mL	div	10分
⑦	フルオロウラシル 生食	2400mg/m2 全量100mLになるように調製	civ	インフューザーを使用して2日間