レジメン名			略名	1クールの日数
GEM+CDDP+キイトルーダ療法				3W
適応病名	胆道癌		所要時間	210分
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	□なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし、■あり（□研究計画書、□その他(　　)	
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル　□1　■2　□3　□4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他(			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他（			
ガイドライン文献名	Kelley RK et al. Lancet 2023; 401: 1853-1865			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	GEM	1000mg/m2	d.i.v	day1,8
2	CDDP	25mg/m2	d.i.v	day1,8
3	キイトルーダ	200mg	d.i.v	day1
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

その他(減量・増量規定など)	GC最大8コース　その後GEM+キイトルーダで

① 生理食塩水	100mL	ルートキープ用
② キイトルーダ 生理食塩水	200mg 100mL	30分
③ 生理食塩水	50mL	フラッシュ用
④ 生理食塩水	500mL	90分
⑤ ソルデム3A	500mL	90分
① パロノセトロン デキサート	0.75mg 6.6mg	15分 ④⑤の側管から投与
② シスプラチン 生理食塩水	25mg/m2 250mL	60分 ④⑤の側管から投与
③ ゲムシタビン 生理食塩水	1000mg/㎡ 100mL	30分 ④⑤の側管から投与