| レジメン名 | | | 略名 | 1クールの日数 |
|---|---|---|---|---|
| ペムブロリズマブ MSI-High | | | | 3または6週 |
| 適応病名 | MSI-Highを有する固形癌 | | 所要時間 | 60分 |
| 実施部署 | ■外来、■病棟、□その他(　　) | | 放射線療法 | □なし、□あり |
| 適応分類 | □初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　) | | | |
| 適応時表示コメント | □なし、□あり | 添付資料 | □なし、■あり | |
| 臨床使用分類 | ■治療（エビデンスレベル　□1　□2　■3　□4　□5　）<br>□研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他 | | | |
| エビデンス | □ガイドライン、□文献、■その他 | | | |
| ガイドライン文献名 | 添付文書 | | | |

| 番号 | 抗癌剤名(商品名)・略号 | 1日投与量 | 投与法 | 投与日(d1,d8等) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペムブロリズマブ | 200mg(400mg) | 点滴 | d1 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

| その他(減量・増量規定など) | |
|---|---|

| Rp 医薬品名 | 投与量 | 投与ルート | 点滴時間・速度 |
|---|---|---|---|
| ① 生食 | 100mL | 点滴 | ルートキープ用 |
| ② キイトルーダ注<br>生食 | 200mg（400mg）<br>100mL | 点滴 | 60分 |
| ③ 生食 | 20mL | | ﾌﾗｯｼｭ用 |