レジメン名			略名	1クールの日数
パージェタ＋ハーセプチン				3週
適応病名	HER2陽性大腸癌		所要時間	初回210分 2回目以降90分
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	□なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	■なし、□あり	
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル　□1　□2　■3　□4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、□文献、■その他			
ガイドライン文献名	TRIUMPH試験　Circulating tumor DNA-guided treatment with pertuzumab plus trastuzumab for HER2-amplified metastatic colorectal cancer; a phase 2 trial Nakamura Y, et al. Nat Med 2021; 27: 1899-1903			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	パージェタ	420mg(初回840mg)	iv	d1
2	ハーセプチン	6mg/kg(初回8mg/kg)	iv	d1
3				
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生食	100mL	iv	ルートキープ用
②	パージェタ注	840mg	iv	60分
	生食	250mL		
③	生食	250mL	iv	60分
④	ハーセプチン注	8mg/kg	iv	90分
	生食	250mL		
⑤	生食	20mL	iv	フラッシュ用

①	生食	100mL	iv	ルートキープ用
②	パージェタ注	420mg	iv	30分
	生食	250mL		
③	生食	100ml	iv	30分
④	ハーセプチン注	6mg/kg	iv	30分
	生食	250mL		
⑤	生食	20mL	iv	フラッシュ用