| レジメン名 | | | 略名 | 1クールの日数 |
|---|---|---|---|---|
| パクリタキセル＋ベバシズマブ | | | wPTXBev | 28日 |
| 適応病名 | 卵巣癌再発 | | 所要時間 | 120分 |
| 実施部署 | ■外来、■病棟、□その他(　　) | | 放射線療法 | ■なし、□あり |
| 適応分類 | □初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　) | | | |
| 適応時表示コメント | ■なし、□あり | 添付資料 | □なし、■あり | |
| 臨床使用分類 | ■治療（エビデンスレベル　□1　□2　□3　□4　□5　）<br>□研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他 | | | |
| エビデンス | ■ガイドライン、□文献、□その他 | | | |
| ガイドライン文献名 | 卵巣がん治療ガイドライン　2025年版<br>Pujade-Lauraine E, Hilpert F, Weber B, et al. Bevacizumab combined with chemotherapy for platinum-resistant recurrent ovarian cancer (AURELIA): an open-label randomized phase III trial. J Clin Oncol. 2014;32(13):1302-1308. | | | |

| 番号 | 抗癌剤名(商品名)・略号 | 1日投与量 | 投与法 | 投与日(d1,d8等) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パクリタキセル | 80mg/m² | div | d1,d8,d15,d22 |
| 2 | ベバシズマブ | 10mg/kg | div | d1,d15 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

| その他(減量・増量規定など) | |
|---|---|

| Rp | 医薬品名 | 投与量 | 投与ルート | 点滴時間・速度 |
|---|---|---|---|---|
| ① | グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ | 100ml | div | 30分 |
| | デキサート | 6.6mg | | |
| | ファモチジン | 20mg | | |
| | ポララミン注 | 5mg | | |
| ② | 生理食塩水 | 250ml | div | 60分 |
| | パクリタキセル | 80mg/m² | | |
| ③ | 生理食塩水 | 100ml | div | 30分 |
| | ベバシズマブ | 10mg/kg | | |
| ④ | 生理食塩水 | 20ml | iv | |