レジメン名			略名	1クールの日数
パクリタキセル＋ベバシズマブ＋ペムブロリズマブ			wPTXBevPem	42日
適応病名	卵巣癌再発（プラチナ抵抗性再発）		所要時間	180分
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル　□1　■2　□3　□4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他			
ガイドライン文献名	Pembrolizumab plus weekly paclitaxel in platinum-resistant recurrent ovarian cancer (ENGOT-ov65/KEYNOTE-B96): a multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	キイトルーダ	400mg/body	div	d1
2	パクリタキセル	80mg/m2	div	d1,d8,d15
3	ベバシズマブ	10mg/kg	div	d1,d15
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	キイトルーダ 6週間間隔、パクリタキセル 1毎週間間隔、ベバシズマブ 2週間間隔

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩水	100ml	div	30分
②	キイトルーダ注	400mg	div	30分
	生理食塩水	100ml		
③	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100ml	div	30分
	デキサート	6.6mg		
	ファモチジン	20mg		
	ポララミン注	5mg		
④	生理食塩水	250ml	div	60分
	パクリタキセル	80mg/m2		
⑤	生理食塩水	100ml	div	30分
	ベバシズマブ	10mg/kg		
⑥	生理食塩水	20ml	iv	