レジメン名			略名	1クールの日数
セツキシマブ併用パクリタキセル療法			Cet＋PTX	28日間
適応病名	頭頸部癌		所要時間	180分
実施部署	■外来、□病棟、□その他(　　)		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	□なし、■あり	添付資料	■なし、□あり	
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル　□1　□2　□3　■4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他(			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他（			
ガイドライン文献名	Eur arch Otorhinolaryngol (2014) 271:373-378			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	アービタックス	1回目400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡	d.i.v	d1,8,15,22
2	パクリタキセル	80mg/m^2	d.i.v	d1,8,15
3				
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	皮膚症状悪化時のセツキシマブ減量規定あり

Rp 医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
① デキサート注 生理食塩水 ポララミン注	6.6mg 100mL 1A	div	30分
② アービタックス	400mg/㎡ (2回目以降 250mg/㎡)	div	初回 2時間 2回目 ～1時間
生理食塩水	250mL		
③ 生理食塩水	100mL	div	フラッシュ
④ ファモチジン注 グラニセトロン注	20mg 100mL	div	30分
⑤ パクリタキセル注 5%ブドウ糖	80mg/m2 250mL	div	1時間
⑥ 生理食塩水	20mL	iv	フラッシュ