レジメン名			略名	1クールの日数
セツキシマブ併用放射線療法			Cet＋RT	1W
適応病名	頭頸部扁平上皮癌		所要時間	90～150分
実施部署	■外来、□病棟、□その他(　　)		放射線療法	□なし、■あり
適応分類	■初発、■進行・再発、■術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	□なし、■あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル　□1　■2　□3　□4　□5　）			
	□研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他(			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他（			
ガイドライン文献名	N Engl J Med 354(6) 567-578,2006			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	アービタックス	1回目400mg/㎡　2回目以降250mg/㎡	d.i.v	d1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	Grade3以上の皮膚症状が発現した場合は減量

Rp 医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
① デキサート注 生理食塩水 ポララミン注	6.6mg 100mL 1A	div	30分
② アービタックス	400mg/㎡ (2回目以降 250mg/㎡)	div	初回 2時間 2回目 ～1時間
生理食塩水	250mL		
③ 生理食塩水	20mL	iv	フラッシュ