レジメン名			略名	1クールの日数
アミバンタマブ皮下注＋CBDCA＋PEM療法				21
適応病名	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌		所要時間	
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	□なし、■あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	□治療（エビデンスレベル　□1　■2　□3　□4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、□文献、■その他 添付文書			
ガイドライン文献名	リブロファズ配合皮下注　添付文書			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴	day1
2	カルボプラチン	AUC5	点滴	day1
3	リブロファズ	1600mg	皮下	day1
4	リブロファズ	2400mg	皮下	day8,15
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	体重80kg以上でリブロファズはday1 2240mg day8以降3360mg

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
1コース目　d1				
①	デキサート注射液3.3mg/mL パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg アロカリス点滴静注235mg/10mL	9.9mg 0.75mg 235mg	持続点滴・末梢	30分
②	ペメトレキセド点滴静注液 500mg 生理食塩液 100mL	500mg/m2	持続点滴・末梢	10分
③	カルボプラチン点滴静注液 生理食塩液 250mL	AUC5	持続点滴・末梢	60分
④	ポララミン注5mg/1mL アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ 100mL	10mg 1000mg	持続点滴・末梢	15分
⑤	リブロファズ配合皮下注	規定量 80kg未満:1600mg 80kg以上:2240mg	皮下	5分
1コース目　d8、15				
①	リブロファズ配合皮下注 ＊経口前投薬あり	規定量 80kg未満:2400mg 80kg以上:3360mg	皮下	5分

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
2-4コース目d1				
①	デキサート注射液3.3mg/mL パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg アロカリス点滴静注235mg/10mL	9.9mg 0.75mg 235mg	持続点滴・末梢	30分
②	ペメトレキセド点滴静注液 500mg 生理食塩液 100mL	500mg/m2	持続点滴・末梢	10分
③	カルボプラチン点滴静注液 生理食塩液 250mL	AUC5	持続点滴・末梢	60分
④	ポララミン注5mg/1mL アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ 100mL	10mg 1000mg	持続点滴・末梢	15分
⑤	リブロファズ配合皮下注	規定量 80㎏未満:2400㎎ 80㎏以上:3360㎎	皮下	5分

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
5コース目以降d1				
①	デキサート注射液3.3mg/mL ポララミン注5mg/1mL アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ 100mL	3.3mg 10mg 1000mg	持続点滴・末梢	30分
②	ペメトレキセド点滴静注液 500mg 生理食塩液 100mL	500mg/m2	持続点滴・末梢	10分
③	生理食塩液 50mL	50mL	持続点滴・末梢	5分
④	リブロファズ配合皮下注	規定量 80kg未満:2400mg 80kg以上:3360mg	皮下	5分