レジメン名			略名	1クールの日数
アミバンタマブ＋ラゼルチニブ			Ami+Laz	4週毎
適応病名	化学療法歴のないEGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21 L858R)陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌		所要時間	別紙参照(体重が80kg以上/未満で違いあり。最大6時間超)
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	■初発、□進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	□なし、■あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	□治療（エビデンスレベル　■1　□2　□3　□4　□5　） ■研究(■多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他			
ガイドライン文献名	Amivantamab plus Lazertinib in Previously Untreated EGFR-Mutated Advanced NSCLC　N Engl J Med. 2024 Oct 24;391(16):1486-1498.			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ライブリバント(Ami)	350mg	点滴	d1
2	ライブリバント(Ami)	体重80kg未満:700mg 体重80kg以上:1050mg	点滴	d2
3	ライブリバント(Ami)	体重80kg未満:1050mg 体重80kg以上:1400mg	点滴	d8,15,22
4	ライブリバント(Ami)	体重80kg未満:1050mg 体重80kg以上:1400mg	点滴	d29(以降2週毎)
5	ラズクルーズ(Laz)	240mg 1日1回	内服	全コース通して毎日
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	減量については添付資料参照。 静脈血栓症の発症抑制のため治療開始後4ヶ月はエリキュース(アピキサバン)2.5mg 1回1錠を1日2回、朝・夕食後で連日内服。 1コース目のみ治療開始2日前から、デカドロン4mg 1回2錠を1日2回、朝・夕食後で内服。 皮疹・爪囲炎対策としてミノサイクリン 100mg 1錠 1x朝食後内服、保湿剤の併用を考慮する。

1-d1　80kg未満

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	500ml	点滴	レートキープ用
②	デキサート6.6mg	9.9mg	側管静注	15分
	ポララミン5mg	10mg		
	アセリオ1000mg	1000mg		
③	ライブリバント350mg	350mg	点滴	
	生理食塩液	243ml		
	＊50ml/hで開始。2時間後患者の状態変化がなければ75ml/hで点滴静注可			
④	生理食塩液	20ml	静注	フラッシュ用

1-d2　80kg未満

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	500ml	点滴	レートキープ用
②	デキサート6.6mg	9.9mg	側管静注	15分
	ポララミン5mg	10mg		
	アセリオ1000mg	1000mg		
③	ライブリバント350mg	700mg	点滴	
	生理食塩液	236ml		
	＊50ml/hで開始。2時間後患者の状態変化がなければ75ml/hで点滴静注可			
④	生理食塩液	20ml	静注	フラッシュ用

1-d8　80kg未満

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	500ml	点滴	レートキープ用
②	ポララミン5mg	10mg	側管静注	15分
	アセリオ1000mg	1000mg		
③	ライブリバント350mg	1050mg	点滴	85ml/h
	生理食塩液	229ml		
④	生理食塩液	20ml	静注	フラッシュ用

1-d15,22　80kg未満

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	500ml	点滴	レートキープ用
②	ポララミン5mg	10mg	側管静注	15分
	アセリオ1000mg	1000mg		
③	ライブリバント350mg	1050mg	点滴	125ml/h
	生理食塩液	229ml		
④	生理食塩液	20ml	静注	フラッシュ用

2-d1,15　80kg未満

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	500ml	点滴	レートキープ用
②	ポララミン5mg アセリオ1000mg	10mg 1000mg	側管静注	15分
③	ライブリバント350mg 生理食塩液	1050mg 229ml	点滴	2時間
④	生理食塩液	20ml	静注	フラッシュ用

1-d1　80kg以上

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	500ml	点滴	レートキープ用
②	デキサート6.6mg	9.9mg	側管静注	15分
	ポララミン5mg	10mg		
	アセリオ1000mg	1000mg		
③	ライブリバント350mg	350mg	点滴	
	生理食塩液	243ml		
	＊50ml/hで開始。2時間後患者の状態変化がなければ75ml/hで点滴静注可			
④	生理食塩液	20ml	静注	フラッシュ用

1-d2　80kg以上

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	500ml	点滴	レートキープ用
②	デキサート6.6mg	9.9mg	側管静注	15分
	ポララミン5mg	10mg		
	アセリオ1000mg	1000mg		
③	ライブリバント350mg	1050mg	点滴	
	生理食塩液	229ml		
	＊35ml/hで開始。2時間後患者の状態変化がなければ50ml/hで点滴静注可			
④	生理食塩液	20ml	静注	フラッシュ用

1-d8　80kg以上

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	500ml	点滴	レートキープ用
②	ポララミン5mg	10mg	側管静注	15分
	アセリオ1000mg	1000mg		
③	ライブリバント350mg	1400mg	点滴	65ml/h
	生理食塩液	222ml		
④	生理食塩液	20ml	静注	フラッシュ用

1-d15　80kg以上

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	500ml	点滴	レートキープ用
②	ポララミン5mg	10mg	側管静注	15分
	アセリオ1000mg	1000mg		
③	ライブリバント350mg	1400mg	点滴	85ml/h
	生理食塩液	222ml		
④	生理食塩液	20ml	静注	フラッシュ用

1-d22　80kg以上

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	500ml	点滴	レートキープ用
②	ポララミン5mg	10mg	側管静注	15分
	アセリオ1000mg	1000mg		
③	ライブリバント350mg	1400mg	点滴	2時間
	生理食塩液	222ml		
④	生理食塩液	20ml	静注	フラッシュ用

2-d1,15　80kg以上

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	500ml	点滴	レートキープ用
②	ポララミン5mg アセリオ1000mg	10mg 1000mg	側管静注	15分
③	ライブリバント350mg 生理食塩液	1400mg 222ml	点滴	2時間
④	生理食塩液	20ml	静注	フラッシュ用