レジメン名			略名	1クールの日数
カルボプラチン+ペメトレキセド+アミバンタマブ			CBDCA+PEM+Ami	21日
適応病名	非小細胞肺癌		所要時間	
実施部署	☑外来、☑病棟、☐その他(　　)		放射線療法	☑なし、☐あり
適応分類	☑初発、☑進行・再発、☐術後補助、☐術前補助、☐超大量、☐遺伝子、☐その他(　　)			
適応時表示コメント	☐なし、☐あり	添付資料	☐なし、☐あり	
臨床使用分類	☑治療（エビデンスレベル ☑1　☐2　☐3　☐4　☐5　） ☐研究(☐多施設自主研究、☐単施設自主研究、☐市販後臨床試験、☐治験、☐その他			
エビデンス	☑ガイドライン、☑文献、☐その他			
ガイドライン文献名	肺癌診療ガイドライン2025年版 Zhou C, Tang KJ, Cho BC, et al. Amivantamab plus chemotherapy in NSCLC with EGFR exon 20 insertions. N Engl J Med. 2023;389(22):2039-51. Passaro A, Wang J, Wang Y, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ペメトレキセド	500mg/m2	div	d1
2	カルボプラチン	AUC 5	div	d1
3	アミバンタミブ			

体重	サイクル	投与日	用量
80kg未満	1サイクル目	1日目	350mg
		2日目	1,050mg
		8日目、15日目	1,400mg
	2サイクル目	1日目	1,400mg
	3サイクル目以降	1日目	1,750mg
80kg以上	1サイクル目	1日目	350mg
		2日目	1,400mg
		8日目、15日目	1,750mg
	2サイクル目	1日目	1,750mg
	3サイクル目以降	1日目	2,100mg

その他(減量・増量規定など)	

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
1コース目　d1				
①	デキサート注射液3.3mg/mL	19.8mg	持続点滴・末梢	30分
	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg	0.75mg		
	アロカリス点滴静注235mg/10mL	235mg		
②	ペメトレキセド点滴静注液 500mg	500mg/m2	持続点滴・末梢	10分
	生理食塩液 30mL			
③	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	持続点滴・末梢	60分
	生理食塩液 250mL			
④	ファモチジン注射液20mg	20mg	持続点滴・末梢	15分
	ポララミン注5mg/1mL	10mg		
	アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ 100mL	1000mg		
⑤	生理食塩液 50mL	50mL	持続点滴・末梢	5分
⑥	ライブリバント点滴静注	規定量	持続点滴・末梢	規定速度
	生理食塩液	全量250mL		
⑦	生理食塩液 50mL	50mL	持続点滴・末梢	5分

1コース目　d2				
①	デキサート注射液3.3mg/mL	9.9mg	持続点滴・末梢	15分
	ファモチジン注射液20mg	20mg		
	ポララミン注5mg/1mL	10mg		
	アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ 100mL	1000mg		
②	生理食塩液 50mL	50mL	持続点滴・末梢	5分
③	ライブリバント点滴静注	規定量	持続点滴・末梢	規定速度
	生理食塩液	全量250mL		
④	生理食塩液	50mL	持続点滴・末梢	5分

1コース目　d8、15				
①	ファモチジン注射液20mg	20mg	持続点滴・末梢	15分
	ポララミン注5mg/1mL	10mg		
	アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ 100mL	1000mg		
②	生理食塩液	50mL	持続点滴・末梢	5分
③	ライブリバント点滴静注	規定量	持続点滴・末梢	規定速度
	生理食塩液 全量250mL	全量250mL		
④	生理食塩液	50mL	持続点滴・末梢	5分

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
2コース目以降d1				
①	デキサート注射液3.3mg/mL	9.9mg	持続点滴・末梢	30分
	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg	0.75mg		
	アロカリス点滴静注235mg/10mL	235mg		
②	ペメトレキセド点滴静注液 500mg	500mg/m2	持続点滴・末梢	10分
	生理食塩液 30mL			
③	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	持続点滴・末梢	60分
	生理食塩液 250mL			
④	ファモチジン注射液20mg	20mg	持続点滴・末梢	15分
	ポララミン注5mg/1mL	10mg		
	アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ 100mL	1000mg		
⑤	生理食塩液 50mL	50mL	持続点滴・末梢	5分
⑥	ライブリバント点滴静注	規定量	持続点滴・末梢	規定速度
	生理食塩液	全量250mL		
⑦	生理食塩液 50mL	50mL	持続点滴・末梢	5分

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
5コース目以降d1				
①	デキサート注射液3.3mg/mL	6.6mg	持続点滴・末梢	30分
	ファモチジン注射液20mg	20mg		
	ポララミン注5mg/1mL	10mg		
	アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ 100mL	1000mg		
②	ペメトレキセド点滴静注液 500mg	500mg/m2	持続点滴・末梢	10分
	生理食塩液 30mL			
③	生理食塩液 50mL	50mL	持続点滴・末梢	5分
④	ライブリバント点滴静注	規定量	持続点滴・末梢	規定速度
	生理食塩液	全量250mL		
⑤	生理食塩液 50mL	50mL	持続点滴・末梢	5分