レジメン名				略名	1クールの日数
CBDCA+PEM+Osimertinib療法					21日
適応病名	肺腺癌			所要時間	100分
実施部署	レ外来、レ病棟、□その他(　　)			放射線療法	レなし、□あり
適応分類	レ初発、□進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)				
適応時表示コメント	□なし、□あり	添付資料	□なし、レあり　下記文献2		
臨床使用分類	レ治療（エビデンスレベル　□1　レ2　□3　□4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他				
エビデンス	レガイドライン、レ文献、□その他				
ガイドライン文献名	1.肺癌診療ガイドライン 2025年版 2.Planchard D, et al.; FLAURA2 Investigators. Osimertinib with or without Chemotherapy in EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med. 2023 Nov 23;389(21):1935-1948				

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	オシメルチニブ（タグリッソ）	80mg	経口	d1-21
2	カルボプラチン（カルボプラチン）・CBDCA	AUC=5	点滴	d1
3	ペメトレキセド（アリムタ）・PEM	500mg/m2	点滴	d1
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	オシメルチニブは毎日内服

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	デキサート注射液6.6mg	9.9mg	点滴静注	30分
	アロカリス点滴静注235mg	235mg		
	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg	1袋		
②	ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m2	点滴静注	10分
	生理食塩液「ヒカリ」	100mL		
③	カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴静注	60分
	大塚生食注	250mL		
④	生理食塩液「ヒカリ」	50mL	点滴静注	ルートフラッシュ