レジメン名			略名	1クールの日数
ゲムシタビン			GEM	28
適応病名	切除不能進行・再発の非小細胞肺癌		所要時間	60分
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	□なし、□あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル　□1　■2　□3　□4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他（　　）			
ガイドライン文献名	Gridelli C, Perrone F, Gallo C, et al. Cheotherapy for elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer:The Multicenter Italian Lung Cancer in the elderly study(MILES) phase III randomized trial. 2003; 95: 362-372.			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ジェムザール	1000mg/m2	点滴	day1,8,15
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	・CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelimumabにおけるday8GEM投与を目的とする。 ・GEM単剤療法自体はプラチナ併用療法との比較で有効性が劣っており，PS良 好な進行非小細胞肺癌患者に対する第一選択とはならないが，高齢者・PS不良例など毒性軽減を重視する必要のある場合における治療の選択肢のひとつとなる。

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	100ml	点滴	30分
	デキサート	6.6mg		
②	ジェムザール	0mg/m2	点滴	30分
	生理食塩液	100ml		
③	生理食塩液	50ml	点滴	5分
	ルート内フラッシュ			