レジメン名			略名	1クールの日数
ダトロウェイ			Dato-Dxd	21日
適応病名	化学療法歴のあるホルモン受容体陽性HER2陰性の手術不能又は再発乳癌		所要時間	初回90分、 2回目以降30分
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	□治療（エビデンスレベル　□1　■2　□3　□4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他			
ガイドライン文献名	Datopotamab Deruxtecan Versus Chemotherapy in Previously Treated Inoperable/Metastatic Hormone Receptor-Positive Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Breast Cancer: Primary Results From TROPION-Breast01			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ダトロウェイ	6mg/kg	点滴	d1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	適正使用ガイドに則って減量・休薬する 初回アセトアミノフェン併用。 角膜障害予防に人工涙液の点眼を行い、コンタクトレンズの使用を控える。

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	パロノセトロン	50ml	DIV	30分
	デキサート	6.6mg		
	ガスター	1V		
②	ダトロウェイ	6mg/kg	DIV	初回90分、2回目以降30分
	生理食塩水	100ml		
③	生理食塩水 フラッシュ用	20ml	IV	

infusion reaction対応として，初回はカロナール内服
またはジクロフェナク坐薬検討.