レジメン名			略名	1クールの日数
フェスゴ(IN,MA)・ドセタキセル3週療法			HPD	21日間
適応病名	HER2陽性早期乳癌，手術不能又は再発乳癌		所要時間	約150分
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	なし
適応分類	■初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル　2，3 ） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他			
ガイドライン文献名	FeDerica試験(Lancet Oncol, 2021)，PHranceSCa試験(European Journal of Cancer. 2021)			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ペルツズマブ・PER	600mg(初回1200mg)	s.c	d1
1	トラスツズマブ・HER	600mg	s.c	d1
2	ドセタキセル・DOC	75mg/m2	iv	d1
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	初回投与はフェスゴIN，2回目以降はMA製剤を使用．初回は前投薬前に30分，2回目以降は15分経過観察を行う．

初回

Rp 医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
① フェスゴIN	15ml	s.c 大腿部のみ	8分以上 2ml/min 以下の速度で
② 生食	100ml	iv	ルートキープ用
③ デキサート注 ポララミン注 グラニセトロン注	6.6mg 1A 3mg	iv	30分
④ ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75mg/m2 500mL	iv	90分
⑤ 生食	20mL	iv	フラッシュ

2回目以降

Rp 医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
① フェスゴMA	10ml	s.c 大腿部のみ	5分以上 2ml/min 以下の速度で
② 生食	100ml	iv	ルートキープ用
③ デキサート注 ポララミン注 グラニセトロン注	6.6mg 1A 1袋	iv	30分
④ ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75mg/m2 500mL	iv	90分
⑤ 生食	20mL	iv	フラッシュ