レジメン名				略名	1クールの日数
フェスゴ(IN,MA)+エリブリン療法				PHES(IN.MA)+Eri	21日間
適応病名	HER2陽性手術不能又は再発乳癌			所要時間	約35-40分
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)			放射線療法	
適応分類	■初発、■進行・再発				
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし、■あり		
臨床使用分類	■治療 (エビデンスレベル　2, 3) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他				
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他				
ガイドライン文献名	FeDerica試験(Lancet Oncol, 2021), EMERALD試験(BMC,2020)				

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ペルツズマブ・PER	600mg(初回1200mg)	s.c	d1
1	トラスツズマブ・HER	600mg	s.c	d1
2	エリブリン・ERI	1.4mg/m2	DIV	d1,8
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	初回投与はフェスゴIN, 2回目以降はMA製剤を使用.

初回

Rp 医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
① フェスゴIN	15mL	s.c 大腿部のみ	8分以上 2ml/min 以下の速度で
② 生理食塩水	100mL	ルートキープ	（infusion reaction対策）
③ デキサート注 生理食塩水	6.6mg 100mL	div	30分 フェスゴ30分経過観察と重複可
④ ハラヴェン(day1,8) 生理食塩水	1.4mg/m2 50mL	div	5分
⑤ 生食	20mL	iv	フラッシュ

2回目以降

Rp 医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
① フェスゴMA	10mL	s.c 大腿部のみ	5分以上 2ml/min 以下の速度で
② デキサート注 生理食塩水	6.6mg 100ml	div	30分 フェスゴ15分経過観察と重複可
③ ハラヴェン(day1,8) 生理食塩水	1.4mg/m2 50mL	div	5分
④ 生食	20mL	iv	フラッシュ

d8は既存のEri単剤のオーダーを使用