| レジメン名 | | | | 略名 | 1クールの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェスゴ(IN,MA)・パクリタキセル療法 | | | | HPP | 21日間 |
| 適応病名 | HER2陽性早期乳癌，手術不能又は再発乳癌 | | | 所要時間 | 約150分 |
| 実施部署 | ■外来、■病棟、□その他(　　) | | | 放射線療法 | なし |
| 適応分類 | ■初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　) | | | | |
| 適応時表示コメント | ■なし、□あり | 添付資料 | □なし、■あり | | |
| 臨床使用分類 | ■治療（エビデンスレベル　2，3 ）<br>□研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他 | | | | |
| エビデンス | □ガイドライン、■文献、□その他 | | | | |
| ガイドライン文献名 | FeDerica試験(Lancet Oncol, 2021)，PHranceSCa試験(European Journal of Cancer. 2021) | | | | |

| 番号 | 抗癌剤名(商品名)・略号 | 1日投与量 | 投与法 | 投与日(d1,d8等) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペルツズマブ・PER | 600mg(初回1200mg) | s.c | d1 |
| 1 | トラスツズマブ・HER | 600mg | s.c | d1 |
| 2 | パクリタキセル・PTX | 90mg/m2 | iv | d1.8.15 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

| | |
|---|---|
| その他(減量・増量規定など) | 初回投与はフェスゴIN，2回目以降はMA製剤を使用．初回は前投薬前に30分，2回目以降は15分経過観察を行う． |

**初回**

| Rp 医薬品名 | 投与量 | 投与ルート | 点滴時間・速度 |
|---|---|---|---|
| ① フェスゴIN | 15ml | s.c<br>大腿部のみ | 8分以上<br>2ml/min 以下の速度で |
| ② 生食 | 100ml | iv | ルートキープ用 |
| ③ デキサート注<br>ポララミン注<br>ファモチジン<br>グラニセトロン注 | 6.6mg<br>1A<br>1A<br>1袋 | iv | 30分 |
| ④ パクリタキセル<br>生食 | 90mg/m2<br>250mL | iv | 60-90分 |
| ⑤ 生食 | 20mL | iv | フラッシュ |

**2回目以降**

| Rp 医薬品名 | 投与量 | 投与ルート | 点滴時間・速度 |
|---|---|---|---|
| ① フェスゴMA | 10ml | s.c<br>大腿部のみ | 5分以上<br>2ml/min 以下の速度で |
| ② 生食 | 100ml | iv | ルートキープ用 |
| ③ デキサート注<br>ポララミン注<br>ファモチジン<br>グラニセトロン注 | 6.6mg<br>1A<br>1A<br>1袋 | iv | 30分 |
| ④ パクリタキセル<br>生食 | 90mg/m2<br>250mL | iv | 60-90分 |
| ⑤ 生食 | 20mL | iv | フラッシュ |