レジメン名				略名	1クールの日数
トロデルビ				SG	21日
適応病名	化学療法歴のあるホルモン受容体陰性HER2陰性の手術不能又は再発乳癌			所要時間	60-180分
実施部署	外来,入院			放射線療法	なし
適応分類	進行・再発				
適応時表示コメント	あり	添付資料	あり		
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル □1 ■2 □3 □4 □5 ） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他				
エビデンス	文献				
ガイドライン文献名	ASCENT試験,ASCENT J02試験				

番号	AS	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	トロデルビ	10mg/kg	点滴	d1,8
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	患者の状態にあわせ適宜減量する.

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	パロノセトロン	50ml	DIV	15分
	デキサート	3.3mg		
	ファモチジン	20mg		
②	トロデルビ	10mg/kg	DIV	初回180分
	生理食塩水	250ml		2回目以降60―120分
③	生理食塩水 フラッシュ用	20ml	IV	

infusion reaction対応として，2―3コースまではカロナール内服またはジクロフェナク坐薬検討.