レジメン名			略名	1クールの日数
トラスツズマブデルクステカン			T-Dxd	21日間
適応病名	HER2陽性手術不能又は再発乳癌		所要時間	初回90分 2回目
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	□なし、□あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	□治療（エビデンスレベル　□1　□2　■3　□4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他（　　）			
ガイドライン文献名	Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Positive Breast Cancer			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	エンハーツ	5.4mg/kg	点滴	d1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	Grade2-4の副作用が認められた場合、適性使用ガイドに則り休薬あるいは一次減量4.4mg/kg、二次減量3.2mg/kgしていく

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg デキサート注射液	100mL 6.6mg	div	15分
②	5%ブドウ糖液	100mL	div	フラッシュ用
③	エンハーツ 5%ブドウ糖液	5.4mg/kg 100mL	div	初回90分　2回目 ※バッグ遮光
④	5%ブドウ糖液	20mL	div	フラッシュ用

※ d2-d4 デキサメタゾン4mg内服