レジメン名		略名	1クールの日数
ツカチニブ＋トラスツズマブ＋カペシタビン		Tuc+HER+Cape	21日
適応病名	HER2陽性乳癌	所要時間	
実施部署	■ 外来、■ 病棟、□その他( )	放射線療法	■ なし、□あり
適応分類	□初発、■ 進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( )		
適応時表示コメント	■ あり(HER投与30分前に解熱剤投与)	添付資料	□なし、■ あり
臨床使用分類	■ 治療 (エビデンスレベル □1 □2 ■ 3 □4 □5) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他		
エビデンス	□ガイドライン、■ 文献、□その他		
ガイドライン文献名	HER2CLIMB試験(第Ⅱ相試験) Murthy RK, Loi S, Okines A, et al. Tucatinib, trastuzumab, and capecitabine for HER2-positive metastatic breast cancer. N Engl J Med. 2020;382(7):597-609.		

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ツカチニブ(ツカイザ)・Tuc	600mgを分2	内服	d1-21
2	トラスツズマブ(ハーセプチン)・HER	初回8mg/kg	点滴	d1
3		2回目以降6mg/kg	点滴	d1
4	カペシタビン(ゼローダ)・Cape	2000mg/m^2を分2	内服	d1-14
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	トラスツズマブ	初回8mg/kg	div	90分
		2回目以降6mg/kg		30分
	注射用水	20ml		
	生理食塩水	250ml		
②	生理食塩水	100ml	div	フラッシュ