

レジメン名		略名	1クールの日数	
アバスタチン・sLV5FU2		BV+sLV5FU2	2W	
適応病名	大腸癌	所要時間	48h	
実施部署	■外来、■病棟、□その他( )	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( )			
ガイドライン 文献名	NCCNガイドライン J Clin Oncol 21:60-5,2003			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	アバスタチン	5mg/kg	d.i.v	d1
2	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	d.i.v	d1
3	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	i.v	d1
4	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	d.i.v	d1-2
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)	中心静脈カテーテルポートを使用			

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
レジメン名 BV+sLV5FU2 (下に前投薬からの投与方法を記載) 医薬品名			
① アバスタチン 生理食塩水	5mg/m <sup>2</sup> 100mL	P	初回90分 2回目60分 3回目以降30分
② グラニセトン注 デキサート注	100mL 6.6mg	P	30分
③ レボホリナート注 5%ブドウ糖	200mg/m <sup>2</sup> 250mL	P	2時間
④ 5-FU 生理食塩水	400mg/m <sup>2</sup> 50mL	P	10分
⑤ 5-FU 生理食塩水	2400mg/m <sup>2</sup> 適量	CVポート	リニアフューザーを使用して 46時間