

レジメン名		略名	1クールの日数	
シスプラチン・ゲムシタビン療法		CDDP+GEM	21日	
適応病名	胆道癌	所要時間	165分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他( )	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、■術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( )			
ガイドライン 文献名	Valle J., et al. N Engl J Med 362:1273-1281.2010			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	div	d1,d8
2	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	div	d1,d8
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
その他 (減量・ 増量規定 など)				

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 シスプラチン・ゲムシタビン療法			
(下に実際の投与方法を記載)			
		投与量	点滴速度
P ①	生理食塩水	500mL	90分
P ②	ソルデム3A	500mL	90分
側 ①	アロキシ注 デキサート注	0.75mg 6.6mg	15分
側 ②	シスプラチン 生理食塩水	25mg/m <sup>2</sup> 250mL	60分
側 ③	ゲムシタビン 生理食塩水	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	30分