

レジメン名		略名		1クールの日数
FOLFIRI+panitumumab		Pmab+mFOLFIRI		14日
適応病名	大腸癌(RAS wild type)	所要時間	48時間	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	ベクティビックス製品情報概要			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ベクティビックス	6mg/kg	cv	d1
2	CPT-11	150mg/m ²	cv	d1
3	5-FU	400mg/m ²	cv	d1
4	5-FU	2400mg/m ²	cv	d1-2
5	l-LV	200mg/m ²	cv	d1
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)				

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 ベクティビックス・FOLFIRI療法

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液	100mL	cv	ルートキープ用
②	ベクティビックス注 生理食塩液	6mg/Kg 100mL	cv	60分
③	生理食塩液	50mL	cv	フラッシュ用
④	アロキシ静注用 デキサート	0.75mg 6.6mg	cv	15分
⑤	レボホリナート注 5%大塚糖液	200mg/m ² 250mL	cv	120分
⑥	イリノテカン注 5%大塚糖液	150mg/m ² 250mL	cv	⑤の側管 120分
⑦	5-FU 生理食塩水	400mg/m ² 50ml	cv	10分
⑧	5-FU 生理食塩水	2400mg/m ² 適量	cv	リアフューザーを使用 して2日間