

レジメン名		略名	1クールの日数	
カドサイラ療法			21日間	
適応病名	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	所要時間	60～120分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	N. Engl. J. Med. 367;19,1783-1791,2012 カドサイラ注添付文書			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	カドサイラ	3.6mg/kg	iv	d1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)	カドサイラは初回投与90分で行い、忍容性が良好であれば2回目以降30分まで短縮可能			

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 カドサイラ療法

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp

医薬品名

- ① グラニセロン注
デキサート注

投与量

100mL

6.6mg

点滴時間・速度

30分

- ② カドサイラ注
生食

3.6mg/kg

250mL

初回90分 2回目以降30分可

- ③ 生食

20mL

フラッシュ用