

レジメン名		略名	1クールの日数	
パージェタ・トラスツズマブ・ドセタキセル3週療法			21日間	
適応病名	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	所要時間	180～300分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	□なし、□あり	
適応分類	■初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	Ann Oncol.2013 Jul 17.CLEOPATRA試験			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	パージェタ	420mg(初回840mg)	iv	d1
2	トラスツズマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	iv	d1
3	ドセタキセル	75mg/m ²	iv	d1
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)	パージェタは初回投与60分で行い、忍容性が良好であれば30分まで短縮可能			
秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会				

レジメン名 パージェタ・トラスツズマブ・ドセタキセル3週療法

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp ①	医薬品名 生食	投与量 100mL	点滴時間・速度 ルートをキープ用
②	パージェタ注 生食	420mg 250mL	30分
③	生食	100mL	30分
④	トラスツズマブ注 生食	6mg/kg 250mL	30分
⑤	デキサート注 ポララミン注 グラニセトロン注	6.6mg 1A 3mg	30分
⑥	ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75mg/m ² 500mL	90分
⑦	生食	20mL	