レジメン名				名	1クールの日数		
パージェタ・トラスツズマブ・ハラヴェン療法					21日間		
適応病	乳癌		所要時間				
実施剖	3署 ■外来、■病棟、□その他() 放射網		療法	□なし、□あり		
適応分	類 □初発、■進行・再発、□術後補助、□術前	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()					
ガイドライン 文献名 The Breast First report of eribulin in combination with pertuzumab and trastuzumab for advanced HER2-positive breazt cancer							
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与1	量	投与法	投与目(d1,d8等)		
1	パージェタ	420mg(初回8	420mg(初回840mg)		d1		
2	トラスツズマブ	6mg/kg(初回8	6mg/kg(初回8mg/kg)		d1		
3	ハラヴェン	1.4mg/m	1.4mg/m2		d1,8		
4							
5							
6							
7							
8							
その他 (減量・ 増量規 など)		火田赤十字病院	がん化	学療法	評価委員会		

レジメン名 パージェタ・トラスツズマブ・ハラヴェン療法 (下に前投薬からの投与方法を記載) 2コース目以降d1

2	投与量 100mL	点滴時間・速度 ルートキープ用
② パージェタ注 生食	420mg 250mL	30分
③ 生食	100mL	30分
④ トラスツズマブ注 生食	6mg/kg 250mL	30分
⑤ デキサート注 生食	6.6mg 100mL	30分
⑥ ハラヴェン注 生食	1.4mg/m2 50mL	5分
⑦ 生食	20mL	

d8は⑤以降のみ